



“USESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS”

**INSECTICIDA AGRÍCOLA PIRETROIDE
CONCENTRADO EMULSIONABLE**

COMPONENTES:	% EN PESO
Ingrediente activo:	
Deltametrina: (S)-Alfa-ciano-3-fenoxibencil (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinil)-2,2-dimetil ciclopropanocarboxilato	2.80%
Equivalente 25 g de i.a./l)	<u>97.20%</u>
Ingredientes inertes:	
Disolvente, emulsificante, antioxidante y compuestos relacionados	100.00
TOTAL:	

INSTRUCCIONES DE USO

“SIEMPRE CALIBRE EL EQUIPO DE APLICACIÓN”

CULTIVO	PLAGA	DOSIS l/ha	OBSERVACIONES	DIASENTE LA ULTIMA APLICACION Y LA COSECHA
ALGODO- NERO	Gusano bellotero (<i>Heliothis zea</i>) (<i>Heliothis virescens</i>)	500/750 0.7	Aplicarse con la frecuencia necesaria de acuerdo con la curva de desarrollo de la plaga(s) principal.	1
SORGO	Mosquita de la panoja (<i>Contarinia sorghicola</i>)	250/350	Iniciar aplicación cuando se encuentre una o dos mosquitas por panoja. Repítase si es necesario.	1
MAIZ	Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	300/500	Aplicación dirigida al cogollo utilizar de 400 a 500 litros. De agua en aplicación terrestre. Repítase si es necesario.	1
JITO- MATE	Gusano del fruto (<i>Heliothis zea</i>)	500/750	Aplicarse con la frecuencia necesaria de acuerdo con la curva de desarrollo de la plaga.	1

Para más información visita:
www.agromundo.com



MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Llenar el tanque de aplicación hasta 3/4 partes de su capacidad, agregar el producto, completar hasta su capacidad y mantener en constante agitación. En aplicaciones terrestres se utilizan de 200-400 litros de agua por hectárea, dependiendo del equipo, intensidad de la infestación y tamaño de la planta. En aplicaciones aéreas se aplican de 40 a 60 litros de agua por hectárea.

CONTRAINDICACIONES: No aplique en horas de calor intenso, ni cuando el viento sea mayor a 15 km/h, o cuando exista alta posibilidad de lluvia que provoque el lavado del producto.

INCOMPATIBILIDAD: Delta Plus® C.E. 2.5, no es compatible con productos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: Delta Plus® C.E. 2.5, no es fitotóxico en los cultivos señalados a las dosis recomendadas.

"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Debe utilizarse equipo de protección adecuado como mascarillas, guantes y overol. No fume, coma ó beba durante las aplicaciones. Evítese la inhalación o contacto directo. Lávese bien, con abundante agua y jabón las partes expuestas al producto. Cámbiese de ropa.

PRIMEROS AUXILIOS: Provóquese el vómito mediante la toma de un vaso de agua tibia con una cucharada de sal. Repítase hasta que el vómito fluya claro. Manténgase al paciente en reposo y llame al médico.

"EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA"

RECOMENDACIONES AL MEDICO: Este producto corresponde al grupo químico de los piretroides sintéticos. Proporcionar tratamiento sintomático.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE: Destruyanse los envases vacíos. No vierta los residuos de las aplicaciones en las acequias, desagües, lagos y ríos. Este producto es tóxico para los peces.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Manténgase en el envase original bien cerrado, en lugares bien ventilados y secos. Guárdese bajo llave.

GARANTÍA: AGROMUNDO, S.A. DE C.V., garantiza la calidad de sus productos. Bajo ninguna circunstancia se responsabiliza de los daños que resulten de no haber utilizado este producto de acuerdo a las instrucciones dadas en la etiqueta.

CATEGORIA TOXICOLOGICA III. MODERADAMENTE TÓXICO

Para más información visita:
www.agromundo.com