



METAFOFOS 600 C. "USO RESTRINGIDO"

LIQUIDO MISCIBLE

COMPONENTES:	% EN PESO
Ingrediente activo:	
Metamidofos: O,S-Dimetil fosforo amidotioato. Equivalente a 600 g. de i.a./L	50.00%
Ingredientes inertes:	<u>50.00%</u>
Disolvente y compuestos relacionados.	
TOTAL:	100.00

INSTRUCCIONES DE USO. "SIEMPRE CALIBRE EL EQUIPO DE APLICACIÓN"



AGROMUNDO®

Las dosis deberán ajustarse según la infestación, tamaño y tipo de cultivo. Aplíquese cuando no corra viento.

CULTIVO	PLAGAS	DOSIS (l/ha)	DIAS ENTRE LA ULTIMA APLICACION Y LA COSECHA
ALFALFA	Chapulín: <i>Brachystola spp.</i> <i>Melanopus</i> . Chicharrita: <i>Empoasca spp.</i> Gusano soldado: <i>Spodoptera exigua</i> . Mariposita amarilla: <i>Colias eurytheme</i> . Pulgón manchado: <i>Therioaphis maculata</i> . Pulgón verde: <i>Acyrtosiphon pisum</i> .	1.0 a 1.5	10
ALGODONERO	Chinche ligus: <i>Lygus lineolaris</i> . Chinche manchadora: <i>Dysdercus spp.</i> Chinche rápida: <i>Creontiades rubrinervis</i> . <i>Creontiades debelis</i> . Chinche: <i>Chlorochroa ligata</i> . Chinche apestosa café: <i>Euschistus servus</i> . Chinche verde: <i>Nezara viridula</i> . Grillo del campo: <i>Acheta spp.</i> Gusano medidor del algodón: <i>Alabama arguillacea</i> . Gusano trozador: <i>Agrotis spp.</i> Pulga saltona: <i>Psallus seriatus</i> . Pulga saltona negra: <i>Spanagonicus albofasciatus</i> . Pulgón del algodón: <i>Aphis gossypii</i> . Trips: <i>Thrips tabaci</i> . Araña roja: <i>Tetranychus spp.</i> Gusano falso medidor: <i>Trichoplusia ni</i> . Gusano peludo: <i>Estigmene acrea</i> . Gusano soldado: <i>Spodoptera exigua</i> . Mosquita blanca: <i>Bemisia tabaci</i> .	1.0 1.0 a 1.5 1.0 0.75 a 1.0 1.0 a 2.0 1.0 a 1.5 1.0	50
BERENJENA	Gusano del fruto: <i>Heliothis zea</i> . Pulga saltona: <i>Epitrix spp.</i> Gusano soldado: <i>Spodoptera exigua</i> . Araña roja: <i>Tetranychus spp.</i> Gusano falso medidor: <i>Trichoplusia ni</i> . Pulgón myzus: <i>Myzus persicae</i> . Gusanos trozadores: <i>Agrotis spp.</i> Gusano del cuerno: <i>Manduca quinquemaculata</i> . Mosquita blanca: <i>Trialeurodes vaporariorum</i> . Chicharrita: <i>Empoasca spp.</i> Trips: <i>Frankliniella spp.</i>	1.0 a 1.5 1.0 1.0 a 1.5 1.0	14
BROCOLI	Chinche alerquín: <i>Murgantia histrionica</i> . Gusano del corazón de la Col: <i>Copitarsia consueta</i> . Gusano soldado <i>Spodoptera exigua</i> . Mariposita blanca: <i>Pieris rapae</i> . Palomilla dorso de diamante: <i>Plutella xylostella</i> . Pulga saltona: <i>Phyllotetra spp.</i> Pulgón de la Col: <i>Brevicoryne brassicae</i> . Pulgón myzus: <i>Myzus persicae</i> . Gusano falso medidor: <i>Trichoplusia ni</i> . Gusanos trazadores: <i>Agrotis spp.</i> Trips: <i>Frankliniella occidentalis</i> , <i>Thrips tabaci</i> .	1.0 1.5 1.0 1.0 a 1.5	21
COL DE BRUSCELAS, COLIFLOR	Chinche alerquín: <i>Murgantia histrionica</i> . Gusano del corazón de la Col: <i>Copitarsia consueta</i> . Gusano soldado <i>Spodoptera exigua</i> . Mariposita blanca: <i>Pieris rapae</i> . Palomilla dorso de diamante: <i>Plutella xylostella</i> . Pulga saltona: <i>Phyllotetra spp.</i> Pulgón de la Col: <i>Brevicoryne brassicae</i> . Pulgón myzus: <i>Myzus persicae</i> . Gusano falso medidor: <i>Trichoplusia ni</i> . Gusanos trazadores: <i>Agrotis spp.</i> Trips: <i>Frankliniella occidentalis</i> , <i>Thrips tabaci</i> .	1.0 1.5 1.0 1.0 a 1.5	21 21 21
CHILE	Diabrotica o doradilla: <i>Diabrotica spp.</i> Grillo del campo: <i>Acheta spp.</i> Gusano soldado: <i>Spodoptera exigua</i> . Mosquita blanca: <i>Trialeurodes vaporariorum</i> . Pulga saltona: <i>Chaetocnema spp.</i> <i>Epitrix spp.</i> Araña roja: <i>Tetranychus spp.</i> Chicharrita: <i>Eutettix tenellus</i> . <i>Empoasca spp.</i> Gusano del fruto: <i>Heliothis zea</i> . Gusano del cuerno: <i>Manduca quinquemaculata</i> . Gusanos trozadores: <i>Agrotis spp.</i> Gusano falso medidor: <i>Trichoplusia ni</i> . Minador de la hoja: <i>Liriomyza spp.</i> Pulgón myzus: <i>Myzus persicae</i> . Trips: <i>Frankliniella spp.</i>	1.0 a 1.5 1.0 1.0 a 1.5	21
JITOMATE TOMATE DE CASCARA	Chicharrita: <i>Eutettix tenellus</i> . Chinche lygus: <i>Lygus spp.</i> Chinche pequeña del tomate: <i>Cyrtopeltis notatus</i> . Diabrotica: <i>Diabrotica spp.</i> Grillo del campo: <i>Acheta spp.</i> Gusano del fruto: <i>Heliothis zea</i> . Gusano falso medidor: <i>Trichoplusia ni</i> . Gusano soldado: <i>Spodoptera exigua</i> . Minador de la hoja: <i>Liriomyza munda</i> . Mosquita blanca: <i>Trialeurodes vaporariorum</i> . Pulga saltona: <i>Epitrix spp.</i> <i>Chaetocnema spp.</i> Pulgón: <i>Aphis spp.</i> Pulgón myzus: <i>Myzus persicae</i> . Trips: <i>Frankliniella tritici</i> . Araña roja: <i>Tetranychus spp.</i> Gusano del cuerno: <i>Manduca quinquemaculata</i> .	1.0 a 1.5 1.0 1.0 a 1.5	7 7
LECHUGA	Pulgón: <i>Aphis spp.</i> Pulgón myzus: <i>Myzus persicae</i> . Gusano soldado: <i>Spodoptera exigua</i> . Gusano falso medidor: <i>Trichoplusia ni</i> . Gusanos trozadores: <i>Agrotis spp.</i>	1.0 a 1.5	14
MELON, PEPINO SANDIA	Araña roja: <i>Tetranychus spp.</i> Barrenador de fruto: <i>Diaphania hyalinata</i> , <i>Diaphania nitidalis</i> . Chicharrita: <i>Empoasca spp.</i> Diabrotica o doradilla: <i>Diabrotica spp.</i> Grillo del campo: <i>Acheta spp.</i> Gusano de fruto: <i>Heliothis zea</i> . Gusano falso medidor: <i>Trichoplusia ni</i> . Gusano peludo: <i>Estigmene acrea</i> . Gusano soldado: <i>Spodoptera exigua</i> . Gusanos trozadores: <i>Pierodroma spp.</i> <i>Agrotis spp.</i> Minador de la hoja: <i>Liriomyza spp.</i> Mosquita blanca: <i>Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Bemisia tabaci</i> . Pulga saltona: <i>Epitrix spp.</i> Pulgón del melón: <i>Aphis gossypii</i> . Pulgón myzus: <i>Myzus persicae</i> . Gusano barrenador de la guía: <i>Melittia satyriniformis</i> .	1.0 a 1.5	1 1 1
PAPA	Catarineta de la papa: <i>Leptinotarsa undecemlineata</i> . Palomilla de la papa: <i>Phthorimaea operculella</i> . Pulgón de la papa: <i>Macrosiphum solanitolii</i> . Pulgón myzus: <i>Myzus persicae</i> . Gusano trozador: <i>Peridroma spp.</i> Chicharrita: <i>Empoasca spp.</i> Gusano soldado: <i>Spodoptera exigua</i> . Gusano falso medidor: <i>Trichoplusia ni</i> . Mosquita blanca: <i>Trialeurodes vaporariorum</i> . Pulga saltona: <i>Epitrix cucumeris</i> . Chinche Lygus: <i>Lygus lineolaris</i> . Trips: <i>Frankliniella spp.</i>	1.0 a 1.5	14
SOYA	Chinche Ligus: <i>Lygus spp.</i> Chinche apestosa café: <i>Euschistus servus</i> . Conchuela del frijol: <i>Epilachna varivestis</i> . Chinche verde: <i>Nezara viridula</i> . Grillo del campo: <i>Acheta spp.</i> Gusano del fruto: <i>Heliothis zea</i> . Gusano terciopelo: <i>Agrotis spp.</i> <i>Prodenia spp.</i> Trips negro: <i>Caliothrips phaseoli</i> . Chicharrita: <i>Empoasca spp.</i> Diabrotica o doradilla: <i>Diabrotica spp.</i> Gusano falso medidor: <i>Pseudoplusia includens</i> . Gusano peludo: <i>Estigmene acrea</i> . Gusano soldado: <i>Spodoptera exigua</i> . Gusano saltarin: <i>Elasmopalpus lignosellus</i> . Mosquita blanca: <i>Trialeurodes vaporariorum</i> .	1.0 a 1.5	14
TABACO	Gusano de la yema: <i>Heliothis virescens</i> . Gusano del cuerno: <i>Manduca sexta</i> . Gusano falso medidor: <i>Trichoplusia ni</i> . Gusano peludo: <i>Estigmene acrea</i> . Gusano soldado: <i>Spodoptera exigua</i> . Gusano trozador: <i>Feltia spp.</i> <i>Agrotis spp.</i> Mosquita blanca: <i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i> . Pulga saltona: <i>Epitrix hirtipennis</i> . Chinche del jitomate: <i>Cyrtopeltis notatus</i> . Pulgón myzus: <i>Myzus persicae</i> . Trips: <i>Thrips tabaci</i> .	1.0 a 1.5	3

Para más información visita:
www.agromundo.com



SL=Sin límite

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

Metafos® 600 C.E. Llenar el tanque de aplicación hasta 3/4 partes de su capacidad, agregar el producto, completar hasta su capacidad y mantener en constante agitación.

EQUIPOS DE APLICACIÓN:

Equipo terrestre: De mochila o tractor, diluir en no menos 200 litros de agua por hectáreas. Aplicación aérea: Diluir en no menos 25 litros de agua por hectárea. Reingreso al campo: Puede entrarse al campo 4 días después de ser aplicado.

CONTRAINDICACIONES:

No aplique en horas de calor intenso, ni cuando la velocidad del viento sea mayor a 15 km/h o cuando exista alta posibilidad de lluvia que provoque el lavado del producto.

INCOMPATIBILIDAD:

Metafos® 600 C.E., no mezclarlo con productos de fuerte reacción alcalina, cuando se desconozca la compatibilidad de una mezcla de uso agrícola, deberá hacerse una prueba previa a su aplicación para evitar efectos fitotóxicos.

FITOTOXICIDAD:

Metafos® 600 C.E., este producto no es fitotóxico en los cultivos señalados a las dosis recomendadas.

“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Use el equipo de protección adecuado y completo. Gorra de algodón o sombrero, mascarilla, overol de algodón, guantes y botas de neopreno. No se aplique contra el viento. No coma, no beba o fume durante las aplicaciones. Si el producto llegará a derramarse en el suelo, no lo pise o lo tape echando tierra con los pies o manos, use una pala o algún objeto que permita cubrir el suelo contaminado. No permita que caiga el rocío de aviones aplicadores. Sitúese de modo que la franja de aspersión no se arrastre hacia usted. Después de un día de trabajo, báñese cuidadosamente y póngase ropa limpia.

Para más información visita:
www.agromundo.com



PRIMEROS AUXILIOS:

Retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto, recostándola en un lugar bien ventilado abrigándola bien. Consiga atención médica inmediatamente. Mantenga al paciente abrigado y en reposo si ha habido alguna salpicadura en los ojos, lávense por o menos durante 15 minutos con agua corriente. Si hubo derramamiento sobre la piel, lávese está cuidadosamente con agua y jabón y quite a la persona intoxicada la ropa contaminada. Si ha ingerido el producto y la persona está consciente, provoque el vómito inmediatamente, introduciendo un dedo en la garganta o administrando agua, tibia salada. Si la persona está inconsciente, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito no trate de introducir absolutamente nada en la boca.

“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA”

RECOMENDACIONES AL MEDICO:

Este producto corresponde al grupo químico de los organofosforados.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Leves: dolor de cabeza visión borrosa, debilidad, náuseas, vómito, diarrea y opresión torácica. Agudos: Contracción de la pupila, salivación, sudoración, lagrimeo, descarga acuosa nasal, debilidad severa, micción y defecación involuntaria, calambres y sensación de asfixia.

TRATAMIENTO:

Si se presenta edema pulmonar, colocar al intoxicado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y cuidar que no se asfixie. en caso de adultos suministrar 2 comprimidos de 0.5 mg de Sulfato de Atropina, repitiendo la dosis si es necesario. La terapia en niños debe de ser supervisada por un médico. Cuando los signos y síntomas de intoxicación sean severos, administrar de 2 a 4 mg de Sulfato de Atropina por vía intravenosa lentamente, hasta completa atropinización (ruboración, boca seca y pupila dilatada). El intoxicado debe mantenerse bajo vigilancia médica, por lo menos durante 48 horas evitando la exposición posterior a cualquier insecticida organofosforado, hasta que se hayan normalizado la colinesterasa sanguínea. El uso de morfina, epinefrina o noradrenalina está contraindicado. **¡NO SE ADMINISTRE ATROPINA A UNA PERSONA CIANÓTICA!**

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

Este producto es tóxico a los peces y a la fauna. Evite el arrastre a los lagos, riachuelos o lagunas, los peces pueden morir si sus aguas son contaminadas. La fauna si entra en contacto con las aguas tratadas puede afectarse. Este producto es muy tóxico a las abejas, ya sea por exposición directa o por residuo en los cultivos. Destruya los envases vacíos.

Para más información visita:
www.agromundo.com



AGROMUNDO®

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Este producto debe almacenarse bajo llave fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas. Almacénese en un lugar bien ventilado. No almacenar cerca de alimentos o piensos.

GARANTÍA:

Como el manejo, transportación, almacenaje y aplicación de este producto están fuera de nuestro control, no nos hacemos responsables del uso del mismo y solamente garantizamos la composición correcta y el contenido neto.

CATEGORIA TOXICOLOGICA II. ALTAMENTE TÓXICO

Para más información visita:
www.agromundo.com